

重庆主要蔬菜施肥推荐配方（2020年度）

作物	产量水平 (kg/亩)	基肥 (kg/亩)		追肥 1 (kg/亩)			追肥 2 (kg/亩)			化肥养分投入量 (kg/亩)			
		有机肥 料	配方肥		化肥		时 期	配方肥		时 期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			推荐配方 N- P ₂ O ₅ - K ₂ O	推荐用 量	品 种	用 量		推荐配方 N- P ₂ O ₅ - K ₂ O	用 量				
大白菜	<3000	400	22-10-8	10-15	尿素	5	苗期	22-5-18	15-20	莲座期	7.8-10.0	1.7-2.5	3.5-4.8
	3000-4000			15-20		5			20-25		10.0-12.2	2.5-3.2	4.8-6.1
	4000-5000			20-25		5			25-30		12.2-14.4	3.2-4.0	6.1-7.4
	>5000			25-30		5			30-35		14.4-16.6	4.0-4.7	7.4-8.7
莴苣	<2000	300	22-8-10	10-13	尿素	5	苗期	22-5-18	10-15	莲座期	6.7-8.5	1.3-1.8	2.8-4.0
	2000-3000			13-16		5			15-20		8.5-10.2	1.8-2.3	4.0-5.2
	3000-4000			16-19		5			20-25		10.2-12.0	2.3-2.8	5.2-6.4
	>4000			19-22		5			25-30		12.0-13.7	2.8-3.3	6.4-7.6
甘蓝	<4500	400	22-10-8	10-15	尿素	5	苗期	22-5-18	20-25	结球初 期	8.9-11.1	2.0-2.7	4.4-5.7
	4500-5500			15-20		5			25-30		11.1-13.3	2.7-3.5	5.7-7.0
	5500-6500			20-25		5			30-35		13.3-15.5	3.5-4.2	7.0-8.3
	>6500			25-30		5			35-40		15.5-17.7	4.2-5.0	8.3-9.6
萝卜	<3000	300	16-14-10	25-30	尿素	5	苗期	15-10-15	15-20	快速 膨大期	8.5-10.1	5.0-6.2	4.7-6.0
	3000-4000			30-35		5			20-25		10.1-11.6	6.2-7.4	6.0-7.2
	4000-5000			35-40		5			25-30		11.6-13.2	7.4-8.6	7.2-8.5
	>5000			40-45		5			30-35		13.2-14.7	8.6-9.8	8.5-9.75
辣椒	<2000	500	16-14-10	30-35	尿素	5-8	苗期	18-5-22	5-7.5	盛果期 追施3次	9.8-13.3	5.0-6.0	6.3-8.4
	2000-3000			35-40		5-8			7.5-10		12.0-15.5	6.0-7.1	8.4-10.6
	3000-4000			40-45		8-10			10-12.5		15.5-18.5	7.1-8.2	10.6-12.7
	>4000			45-50		8-10			12.5-15		17.6-20.7	8.2-9.2	12.7-14.9

番茄	<3000	400	16-14-10	30-35	尿素	3-5	苗期	15-5-25	10-12	盛果期 追施3次	10.7-13.3	5.7-6.7	10.5-12.5
	3000-4000			35-40		3-5			12-14		12.4-15.0	6.7-7.7	12.5-14.5
	4000-5000			40-45		5-8			14-16		15.0-18.1	7.7-8.7	14.5-16.5
	>5000			45-50		5-8			16-18		16.7-19.8	8.7-9.7	16.5-18.5
榨菜	<2000	400	12-6-7	15-20	尿素	6-8	苗期	22-8-10 硫酸钾型	15-20	茎瘤 膨大前	7.9-10.5	2.1-2.8	2.5-3.4
	2000-2500			20-25		6-8			20-25		9.6-12.2	2.8-3.5	3.4-4.2
	2500-3000			25-30		8-10			25-30		12.2-14.8	3.5-4.2	4.2-5.1
	>3000			30-35		8-10			30-35		13.9-16.5	4.2-4.9	5.1-5.9

备注：

- 1、蔬菜地土壤 pH 小于 5.5 时，可每亩施用生石灰 50~200 公斤或土壤调理剂 50~200 公斤或石灰氮 50~100 公斤。
- 2、有机肥料特指符合标准的商品有机肥或生物有机肥。
- 3、蔬菜缺硼，可叶面喷施 0.2%~0.3% 硼砂溶液 2~3 次。
- 4、蔬菜缺钙，可叶面喷施 0.3%~0.5% 硝酸钙溶液或氯化钙溶液 2~3 次。
- 5、蔬菜缺锌，可叶面喷施 0.1%~0.5% 硫酸锌溶液 2~3 次。
- 6、榨菜需肥旺盛期是茎瘤膨大期，此时榨菜叶片已覆盖全田，施肥操作较困难，故第二次追肥定为茎瘤膨大前（俗称“封林”前）。